

線形代数学

1

履修にあたって

2007年度1セメスタ開講
 電子情報システム学科 必修
 時間割: 水曜3時限 (12:50-14:20)
 講義室: K101(AVホール)

担当

草苅良至 (電子情報システム学科)
 教員室: G I 511
 (オフィスアワー、水曜日1時限)
 内線: 2095
 e-mail: kusakari@akita-pu.ac.jp

質問は上記のいずれかに行なうこと。
 注意 計算用のノートを準備すること。

2

教科書等

教科書:

「やさしく学べる線形代数」
 石村園子著 共立出版社 2000円

参考書:

「テキスト 線形代数」
 小寺平治著 共立出版社 2000円
 「プログラミングのための線形代数」
 平岡和幸、堀玄 共著、オーム社 3000円

「線形代数とその応用」
 G・ストラング著 産業図書 4200円

演習書:

「演習と応用 線形代数」
 寺田文行・木村宣昭著
 サイエンス社 1700円

3

線形代数学とは、

○線形代数学とは、簡単にいうと
 「行列」や「ベクトル」
 を扱う数学です。

○高校の数学Cで扱った行列を、
 より一般的に拡張したものを扱います。

4

数学Cの復習

数学Cでは主に 2×2 の行列を扱っているはずです。
 ここでは、復習もかねてそれらを順に振り返ります。

○慣用的な行列の表現

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ x & 5 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$$

行列を表す変数には、
 太大英文字を用います。

5

行列の相等

行列 A, B が同じ型で対応する成分が等しいとき、
 行列 A と行列 B は「等しい」といいます。
 記号では以下のように書きます。

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a = p, & b = q \\ c = r, & d = s \end{cases}$$

例

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

6

例題

次の等式が成り立つように、 x, y, u, v の値を定めよ。

$$\begin{pmatrix} x-y & x+y \\ u+1 & 2v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

解

行列の相等の定義より、

$$\begin{cases} x-y=1, & x+y=3 \\ u+1=2, & 2v=4 \end{cases}$$

が成り立つ。よって、

$$x=2, y=1, u=1, v=2$$

7

練習

次の等式が成り立つように、 x, y, u, v の値を定めよ。

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ -x & -2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u & 3v \\ 3 & 12 \end{pmatrix}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ x & y \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} u & v \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{とする。}$$

$$A = B$$

8

行列の加法

同じ型の行列 A, B について、対応する成分の和を成分とする行列を、 A と B の和といい、

$$A + B$$

と表す。

記号では以下のように書きます。

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+p & b+q \\ c+r & d+s \end{pmatrix}$$

9

例題

次の計算をせよ。

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

解

行列の和の定義より、

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+(-4) & -2+3 \\ -3+2 & 6+(-1) \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

10

練習

次の計算をせよ。

(1)

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

(2)

$$\begin{pmatrix} 6 & -5 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

(3)

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 9 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$$

11

加法逆元($-A$)

行列 A に対して、 A の各成分の符号を反転させた行列を $-A$

で表す。

(なお、この行列 $-A$ は、加法に関する A の逆元(加法逆元)とも呼ばれる。)

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{のとき、} \quad -A = \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$$

12

零行列

すべての成分が0である行列を**零行列**といい、 $\mathbf{O}$ で表す。

$$\mathbf{O} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

13

例題

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{に対して、次の行列を求めよ。}$$

$$(1) -\mathbf{A} \quad (2) -(-\mathbf{A}) \quad (3) \mathbf{A} + (-\mathbf{A})$$

解

$$(1) -\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2) -(-\mathbf{A}) = -\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{A}$$

$$(3) \mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{O}$$

14

練習

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & x \end{pmatrix} \quad \text{に対して、次の行列を求めよ。}$$

$$(1) -\mathbf{A}$$

$$(2) -(-\mathbf{A})$$

$$(3) \mathbf{A} + (-\mathbf{A})$$

15

加法についての性質

同じ型の行列の加法について、
次ぎのことが成り立つ。

1. 交換法則 $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$
2. 結合法則 $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$
3. 零行列と、加法逆元の存在。

$$\mathbf{A} + \mathbf{O} = \mathbf{A}, \quad \mathbf{O} + \mathbf{A} = \mathbf{A},$$

$$\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{O}, \quad (-\mathbf{A}) + \mathbf{A} = \mathbf{O}$$

16

行列の差

同じ型の行列 $\mathbf{A}$ と $\mathbf{B}$ に対して

$$\mathbf{A} + (-\mathbf{B})$$

を、

$\mathbf{A}$ と $\mathbf{B}$ の**差**といい

$$\mathbf{A} - \mathbf{B}$$

と書く。記号で表すと次のようになる。

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-p & b-q \\ c-r & d-s \end{pmatrix}$$

17

練習

次の計算をせよ。

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 9 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$$

18

行列の実数倍(スカラー倍)

実数 k に対して、行列 A の各成分を k 倍する行列を kA

と書く。記号では次のように書く。

$$k \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{pmatrix}$$

また、実数倍の定義から、次ぎの性質が成り立つ。

$$1A = A, \quad (-1)A = -A, \quad 0A = O, \quad kO = O$$

19

例題

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{に対して、次の行列を求めよ。}$$

$$(1) 3A \quad (2) (-2)A$$

解

$$(1) \quad 3A = 3 \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times (-1) & 3 \times 2 \\ 3 \times 4 & 3 \times 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ 12 & 15 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad (-2)A = (-2) \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-2) \times (-1) & (-2) \times 2 \\ (-2) \times 4 & (-2) \times 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -8 & -10 \end{pmatrix}$$

20

練習

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}, \quad k=2, l=-3$$

とする。

次の行列を求めよ。

$$(1) kA \quad (2) lA$$

$$(3) kB \quad (4) lB$$

21

実数倍についての性質

行列の実数倍について、次ぎのことが成り立つ。
ここで、 A, B は同じ型の行列で、 k, l は実数である。

1. $(kl)A = k(lA)$
2. $(k+l)A = kA + lA$
3. $k(A+B) = kA + kB$

22

練習

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。

次の行列を求めよ。

$$(1) 2A - 3C \quad (2) 2A - 3B + 4C$$

$$(3) 2(A+B) - A \quad (4) 2(3A - B) + 2B - C$$

23

ベクトル

ベクトル

x 成分、 y 成分を並べた (x, y) のように、
複数の成分を並べたもの。
成分が n 個のベクトルは、
 $1 \times n$ あるいは、 $n \times 1$ の行列とみなせる。
 $1 \times n$ のとき、行ベクトル
 $n \times 1$ のとき、列ベクトルとよぶ。

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 \end{pmatrix} \quad a = (a \quad b) \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

行ベクトル

列ベクトル

24

ベクトルと行列の積

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad p = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$$

とする。

行列と列ベクトルの積

$$Ax = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix}$$

行ベクトルと行列の積

$$pA = \begin{pmatrix} p & q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} pa+qc & pb+qd \end{pmatrix}$$

25

行列と連立方程式

行列とベクトルを用いて連立方程式を表現できる。

次のような連立方程式

$$\begin{cases} ax+by = p \\ cx+dy = q \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

は、

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} \quad \dots \textcircled{2}$$

と書く事ができる。

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad p = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} \text{とおくと、}$$

$$Ax = p \quad \dots \textcircled{3}$$

とも書ける。

①、②、③は、同じ連立方程式の異なる表現。

26

1次方程式と2元連立1次方程式

一次方程式

未知数

既知の値

$$5x = 3$$

既知の値

2元連立1次方程式

$$\begin{cases} 2x+3y = 3 \\ -x+5y = 7 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad p = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \text{として、}$$

成分全て
既知の値

$$Ax = p$$

成分全て
既知の値成分全て
未知数

27

2組の式から行列の積へ

次のような2組の式を考える。

$$\begin{cases} ax+by = s \\ cx+dy = t \end{cases} \quad \dots \textcircled{1} \quad \begin{cases} es+ft = u \\ gs+ht = v \end{cases} \quad \dots \textcircled{2}$$

このとき、 u, v を s, t を用いずに、 x, y で表す。①の s, t を、②に代入する。

$$\begin{cases} u = (ea+fc)x + (eb+fd)y \\ v = (ga+hc)x + (gb+hd)y \end{cases} \quad \dots \textcircled{3}$$

これを行列の表現で調べてみる。

28

$$\begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \dots \textcircled{1}, \quad \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s \\ t \end{pmatrix} \quad \dots \textcircled{2},$$

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ea+fc & eb+fd \\ ga+hc & gb+hd \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \dots \textcircled{3},$$

と、表現できる。

ここで、①'と②'から形式的に、次のような表現を書いてみる。

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \dots \textcircled{3}',$$

このことより、

$$\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ea+fc & eb+fd \\ ga+hc & gb+hd \end{pmatrix}$$

と決めてあげると都合がよさそう。

29

行列積の定義

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \quad \text{とする。}$$

行列 B と行列 A の積 BA は、

$$BA = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ea+fc & eb+fd \\ ga+hc & gb+hd \end{pmatrix}$$

で定義される。

30

行列積の覚え方


 $\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ の計算

(1) まず、出来上がる行列の型をきめる。

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \begin{matrix} \square & \square \\ \square & \square \end{matrix}$$

(2) 個々の成分を求める。



31

練習

次の行列を求めよ。

(1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

(2)

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(3)

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

(4)

$$\begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

32

行列積の性質

$$AB \neq BA$$

となる行列A、行列Bがある。

33

例題

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{とする。}$$

 AB , BA を計算することによって、 $AB \neq BA$ を確かめよ。

解

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+3 & 2+0 \\ 0+6 & 0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & 1+4 \\ 3+0 & 3+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{なので、} \quad AB \neq BA$$

34

単位行列

対角成分が1で、他の成分が0である行列を単位行列といい、 E で表す。

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

35

単位行列と零行列の性質

 A を任意の正方行列、 A と同じ型の単位行列を E 零行列を O とする。このとき、次が成り立つ。

1. $AE = EA = A$

2. $AO = OA = O$

36

零因子

行列の積では、 $A \neq O$ かつ $B \neq O$ であっても、 $AB = O$ となることがある。
このとき、 A および B を**零因子**という。

37

例

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \text{ とする。}$$

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2-2 & -4+4 \\ 4-4 & -8+8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

38

逆行列

正方行列 A に対して、
 $AX = XA = E$
を満たす正方行列 X が存在するならば、
 X を A の**逆行列**といい
 A^{-1}
で表す。

39

連立方程式の解法から逆行列へ

次のような連立方程式を考える。

$$\begin{cases} ax+by = p \\ cx+dy = q \end{cases} \quad \text{行列で表すと} \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, p = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix} \text{ とおく。}$$

$$Ax = p$$



$$x = A^{-1}p$$

$$ax = b \Leftrightarrow x = a^{-1}b$$

$$5x = 3 \Leftrightarrow x = 5^{-1} \times 3 = \frac{3}{5}$$

通常のスカラーでの規則に、
合うように逆行列 A^{-1} を
定義したい。

40

$$\begin{cases} ax+by = p \cdots (1) \\ cx+dy = q \cdots (2) \end{cases} \text{ を解く。}$$

$$\begin{array}{rcl} (1) \times d - (2) \times b & & \\ adx + bdy & = & dp \\ - bcx + bdy & = & bq \\ \hline (ad-bc)x & = & dp - bq \end{array}$$

$ad - bc \neq 0$ と**仮定**すると、

$$x = \frac{1}{(ad-bc)}(dp - bq)$$

$$\begin{array}{rcl} (1) \times c - (2) \times a & & \\ acx + bcy & = & cp \\ - acx + ady & = & aq \\ \hline (bc-ad)y & = & cp - aq \end{array}$$

$ad - bc \neq 0$ と**仮定**すると、

$$y = \frac{1}{(ad-bc)}(-cp + aq)$$

41

よって、 $ad - bc \neq 0$ のときには、

$$\begin{cases} ax+by = p \cdots (1) \\ cx+dy = q \cdots (2) \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{1}{(ad-bc)}(dp - bq) \\ y = \frac{1}{(ad-bc)}(-cp + aq) \end{cases}$$

行列を用いると、

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$$

$ad - bc \neq 0$ ならば、

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{(ad-bc)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$$

この部分を逆行列に
したい。

42

逆行列の存在判定

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ とする。}$$

$(ad - bc) \neq 0$ のとき、 A の逆行列 A^{-1} が存在して、

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$(ad - bc) = 0$ のとき、 A の逆行列は存在しない。

43

行列式

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ とする。}$$

このとき、 A の行列式 $|A|$ は次式で定義される。

$$|A| = ad - bc$$

行列式は、次ぎのように書かれることもある。

$$\det(A) = ad - bc$$

44

行列式・逆行列の求め方

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{ とする。}$$

$|A|$ の求め方




乗算する符号が正
乗算して符号が負

$$|A| = ad - bc$$

A^{-1} の求め方

$|A| \neq 0$ を確認して、



交換

乗算して符号が負

$\frac{1}{|A|}$ 倍

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

45

練習

次の行列に対して、逆行列を持つかどうかを調べ、もし持てばそれを求めよ。

(1)

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

(2)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

(3)

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

(4)

$$\begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 4 & -10 \end{pmatrix}$$

46

逆行列の性質

正方行列 A が逆行列 A^{-1} を持つとき、次のことが成り立つ。

$$1. AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

$$2. (A^{-1})^{-1} = A$$

同じ型の正方行列 A 、 B が共に逆行列を持つとき、積 AB も逆行列を持ち、次のことが成り立つ。

$$3. (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

順序に注意すること。

47